

患者用药说明书

Paracetamol 450mg, Orphenadrine 35mg

药物的疗效?

Paracetamol 和 orphenadrine 的药物组合常用于治疗肌肉疼痛。Orphenadrine 是一种肌肉松弛剂，而 Paracetamol 则用于缓解疼痛。

我应该如何服药/用药?

- 你可以随餐或空腹服用 Paracetamol, Orphenadrine。
- 请勿一次服用超过两片药片，并确保每次剂量之间隔至少四个小时。请勿在 24 小时内服超过六片药片。
- 为了避免药物过量，当服用这个药物的时候，请勿服用其他含有 Paracetamol 的药物。

如果我忘了服药/用药，我应该怎么做?

Paracetamol, Orphenadrine 一般是根据需要在需要缓解疼痛时才使用。只有在医生的指导下，才能定期服用。

如果您错过服药，在想起来的时候尽快服用。如果已接近下一次服药的时间，您只需照常服用原定的剂量。请别为了补回错过的剂量，而在下一次把剂量加倍或服用过量药片。

服药/用药必须注意哪些事项?

如果您有以下情况或习惯，请通知您的医生：

- 对这种药物或药物所含有的某种成分过敏
- 患有肝或肾脏问题
- 患有青光眼（眼内压异常升高）
- 患有泌尿系统或前列腺增生问题
- 患有重症肌无力疾病（一种导致肌肉无力的免疫性疾病）
- 经常大量饮酒
- 怀孕、计划怀孕或正在哺乳

- 正在服用其他药物，包括保健品、传统药物和草药疗法

这种药物有哪些常见的副作用？

就如任何药物，这种药物也可能会引起一些副作用，但并非所有人都会出现这些副作用。如果副作用变得严重以致影响您的生活，请咨询您的医生。

Paracetamol, Orphenadrine 的常见副作用包括：

- 嗜睡
 - 避免驾驶或参与需要集中注意力的活动
- 恶心或呕吐
 - 与食物一起或在饭后服药，可减少恶心和呕吐
- 头晕
 - 避免驾驶或参与需要集中注意力的活动
- 口干
- 干眼

出现哪些罕见且严重的副作用须马上求医？

药物过敏有以下一项或多项症状：

- 脸部/眼睛/嘴唇/舌头肿胀
- 呼吸困难
- 全身发痒出现皮疹

如果出现以上任何症状，您应该停止用药并立即去看医生。

如果发生以下严重的副作用，也应该立即去看医生：

- 尿潴留
- 持续快速的心跳

服药/用药时，有哪些食物或药物是我应该忌口的？

避免在服用此药时喝酒，因为可能会导致过度嗜睡。

我应该如何存放这种药物？

储存在阴凉和干燥的环境中，避免让阳光直接照射在药物上。请存放在儿童不易触及之处。

我应该如何安全地扔弃这种药物？

请将此药装入黑色垃圾袋并密封好，然后再扔进垃圾槽或垃圾桶。

免责声明

请注意，以上并非完整的副作用列表。如果您对药物有任何担忧，或者您认为该药物有引起其他副作用，请咨询您的医生或药剂师。

如果您服用的剂量超出了所建议的剂量，请立即求医。本说明书所提供的信息并不能取代您医生提供的建议。更多信息，请咨询您的医疗护理人员。

Alexandra Hospital


378 Alexandra Road, Singapore 159964

NUHS Hotline: (65) 6908 2222

NUHS General Enquiries: contactus@nuhs.edu.sg

NUHS Appointments: appointment@nuhs.edu.sg

www.ah.com.sg



<https://for.sg/9ce2eu>

扫描 QR 码查看
完整的设施列表!

The information in this brochure is meant for educational purposes and should not be used as a substitute for medical diagnosis or treatment. Please seek your doctor's advice before starting any treatment, or if you have any questions related to your health, physical fitness or medical condition.

Information is correct at time of printing May 2024 and subject to revision without prior notice.

© 2023, Alexandra Hospital All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or shared without prior permission from Alexandra Hospital